

Para conseguir ayuda y/o apoyo para dejar de usar drogas, llame al **877-AYÚDESE (877-298-3373)** o al **311**. Para más información sobre dónde puede conseguir el equipo de resuscitación de sobredosis en opiáceos (Naloxone), pregunte por “prevención de sobredosis”.

- + La mayoría de las sobredosis ocurren en la casa.
  - + Las medicinas recetadas para el dolor – como por ejemplo Oxycodone (Oxicodona) – y/o medicinas para el dolor.
  - + La mayoría de las sobredosis con drogas suceden con opiáceos, incluyendo heroína al mismo tiempo en su cuerpo.
- La mayoría de las sobredosis ocurren cuando usted tiene más de un tipo de droga

**USTED PODRÍA ESTAR EN PELIGRO DE UNA SOBREDOSIS DE DROGAS.**

# PREVÉN



# LA SOBREDOSIS DE DROGAS

# PREVEN LA SOBREDOSIS DE DROGAS

- + **Si usa drogas, trate de estar con otra gente.** Si algo le ocurre estando sólo, nadie podrá ayudarle.
- + **Conozca sus límites.** Si usted ha estado un tiempo sin usar drogas y decide usar nuevamente, su riesgo de sobredosis es mucho más alto. Use menos cantidad de lo acostumbrado.
- + **No mezcle drogas.** Hay más probabilidades de sufrir una sobredosis si combina opiatos, como analgésicos o heroína, con alcohol, cocaína, benzos u otras drogas.

## INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SOBREDOSIS

- + **Llame al 911.**
- + **Si la persona no está respirando, déle respiración artificial (boca a boca).** Incline la cabeza de la persona hacia atrás, apriétele la nariz y déle dos respiraciones rápidas. Continúe con una respiración por cada cinco segundos.
- + **Suministre Naloxone (Narcan) si lo tiene.** Use Narcan en forma de inyección en la parte superior del brazo o en el muslo; o use Narcan en forma de aerosol (spray) aplicando la mitad en una fosa nasal y el resto en la otra.
- + **Ponga a la persona sobre su costado/ lado.** Espere a que llegue la ayuda.

